



Myślubórz, 02.01.2023 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W MYŚLIBORZU

Hanna Wardęcka

**Hodowcy drobiu powiatu
myśluborskiego - chów
przyzagrodowy**

Nasz znak: PIW.Z. 913 01 2023

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia: .

W związku z pismem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza z dnia 28 grudnia 2022r. dotyczącego założeń posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego MRiRW które odbyło się 8 grudnia 2022r. oraz w związku z obecną sytuacją meteorologiczną predysponującą do szerzenia się wirusa Grypy Ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśluborzu przypomina o zasadach bioasekuracji, drogach szerzenia oraz sposobach zabezpieczenia fermy przed wirusem HPAI.

Grypa ptaków (AI - *Avian influenza*) należy do chorób zwierząt listy OIE jako **niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu**, która może powodować śmiertelność do 100% stada.

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z:

- kałem
- wydzieliną z oczu
- wydzieliną z dróg oddechowych
- wydychanym powietrzem.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany:

- kury i indyki - duża wrażliwość na zakażenie, występowanie klinicznej postaci choroby;
- kaczki i gęsi - wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepami wirusa AI, ale tylko niektóre bardzo zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choroby. **Drób wodny uważa się za potencjalny rezerwuar i źródło wirusa dla drobiu;**



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśluborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślubórz

tel: (95) 747-22-96, e-mail: mysliborz.piw@wetgiw.gov.pl,

- perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy - wrażliwość podobna jak u kur i indyków;
- strusie - u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i upadki 20-30%. Emu jest mniej wrażliwe, nie występują objawy kliniczne ani upadki;
- ptaki trzymane w klatkach, włączając papugowate i śpiewające - wirusy AI izolowane na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd stwierdzane u ptaków trzymanyh w klatkach.

Drogi zakażenia:

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Z głównych **objawów HPAI** u drobiu są depresja, spadek pobrania wody, spadek apetytu, spadek / utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia i dzwonek, silne łzawienie, obrzęk zatok podczodołowych, kichanie i duszność, biegunka.

W przypadku podejrzenia choroby hodowca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować PLW w Myśliborzu Tel. [95 747 22 96](tel:957472296)

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRYZAGRODOWY

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;



- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.
- w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego, wyposażenie gospodarstwa w maty dezynfekcyjne nasączone środkiem do dezynfekcji w stężeniu zapewniającym skuteczną neutralizację wirusa grypy ptaków.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

- karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

- słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymanywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
- należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
- nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
- nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Przestrzeganie zasad bioasekuracji jest jedynym skutecznym sposobem na zabezpieczenie fermy przed wirusem Grypy Ptaków !

POWIATOWY LEKARZ
WETERYNARII
W MYŚLIBORZU
lek. wet. Hanna Wardęcka

POWIATOWY LEKARZ
WETERYNARII
W MYŚLIBORZU
lek. wet. Hanna Wardęcka

Otrzymują:

- 1) Hodowcy drobiu powiatu myśliborskiego – chów przyzagrodowy
- 2) Aa



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

tel: (95) 747-22-96, e-mail: mysliborz.piw@wetgiw.gov.pl,

UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

